

麻しん(はしか) 登園届

保育園 園長殿

クラス名

園児氏名

【登園の目安】

◎主症状が消えてから(解熱後)3日を経過していること

◎発症初期には、高熱、咳、鼻水、結膜充血目やに等の症状がみられます。発熱は一時期下がる傾向になりますが、再び上昇し、この頃に口の中に白いぶつぶつ(コプリック斑)がみられます。その後、赤い斑点のようなやや盛り上がった発しんが顔、頸部から全身に拡がっていきます。発しんは徐々につながり、色素沈着して消えます。肺炎や脳炎を合併した場合、重症化します。潜伏期間8~12日で、主な感染経路は飛沫感染、接触感染及び空気感染です。感染力が非常に強く、免疫がない場合100%の人が感染します

	発症日 (0日目)	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
月日	/	/	/	/	/	/	/	/
検温	朝 °C	朝 °C	朝 °C	朝 °C	朝 °C	朝 °C	朝 °C	朝 °C
	夕 °C	夕 °C	夕 °C	夕 °C	夕 °C	夕 °C	夕 °C	夕 °C
発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱
解熱	解熱	解熱	解熱	解熱	解熱	解熱	解熱	解熱
発しんの 状態								
	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目	14日目	
月日	/	/	/	/	/	/	/	
検温	朝 °C	朝 °C	朝 °C	朝 °C	朝 °C	朝 °C	朝 °C	
	夕 °C	夕 °C	夕 °C	夕 °C	夕 °C	夕 °C	夕 °C	
発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	
解熱	解熱	解熱	解熱	解熱	解熱	解熱	解熱	
発しんの 状態								

令和 年 月 日より発症し、 月 日に医療機関『 』
において麻しん(はしか)と診断されました。
解熱後3日を経過し、体調が回復しましたので 月 日より登園します。

令和 年 月 日

保護者氏名

※保護者の皆様へ

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが健康に生活できるよう、登園の目安を参考に登園届の記入及び提出をお願いいたします。

藤島こりす保育園 藤島くりくり保育園